

Tolkningsmall för CGI - sjukdomens svårighetsgrad (CGI-S)

Skalans beteckning:

Clinical Global Impression - Severity

Dokumentets datum:

2013-04-12

Ansvariga för dokumentet:

Johan Lundberg, Mats Adler

Förkortningen betyder:

Clinical Global Impression – sjukdomens svårighetsgrad.

Version:

Svensk översättning.

Användningsområde:

CGI-S är en bedömerskattning. Den är avsedd att användas för att kvantifiera bedömarens intryck av hur svårt psykiskt sjuk en patient är under och i samband med undersökningstillfället. Bedömningen görs mot bakgrund av bedömarens samlade kliniska erfarenhet av just denna patientpopulation, exempelvis de med depressiv episod. Om patienten lider av flera psykiska sjukdomar/tillstånd ska den sammanlagda effekten av dessa bedömas. Både symtomnivå och funktionspåverkan ska vägas in i bedömningen av sjukdomsgrad. Tidsintervall: just nu.

Observera att bedömningen ska avse ”dagsformen”, dvs inte hela den aktuella sjukdomsepisoden.

Tolkning:

- 0 = Ej bedömt
- 1 = Normal, inte alls sjuk
- 2 = Gränsfall för psykisk sjukdom
- 3 = Lindrigt sjuk
- 4 = Måttligt sjuk
- 5 = Påtagligt sjuk
- 6 = Allvarligt sjuk
- 7 = Bland de mest extremt sjuka patienterna

Exempel 1: Kvinna med läkemedelsbehandlad ADHD och depressiv episod för vilken hon nu behandlats framgångsrikt med ECT . Skattning med CGI-S görs för utvärdering efter sista ECT . Den depressiva episoden har i princip helt gått i remission, så nuvarande symtom och funktionspåverkan härrör bara från ADHD. Förslag till CGI-S i samband med att ECT avslutas: 3 (Lindrigt sjuk) . *Kommentar:* Eftersom patienten lider av flera diagnoser/tillstånd ska den sammanlagda effekten av dessa bedömas.

Exempel 2: Kvinna med emotionellt instabil personlighetsstörning som föregående dag lades in akut på vårdavdelningen i mycket agiterat tillstånd. Det förekom själskadehandlingar, psykomotorisk agitation, höga rop och hot. Patienten blev föremål för tvångsåtgärder enligt

LPT då hon störde ordningen på avdelningen. Nu vill hon bli utskriven. Hon känner sig lugn, och har också fungerat väl på avdelningen under förmiddagen: skött sin ADL, gjort en adekvat planering för de kommande dagarna och uppvisar ett väsentligen normalt psykiatriskt status. Förslag till CGI-S: 1-2. (Normal, inte alls sjuk eller Gränsfall för psykisk sjukdom) *Kommentar:* Tidsintervall för CGI-S bedömningen är ”just nu”, så gårdagens symtom och funktionsnivå ska inte tas i beaktande.

Exempel 3: Man med schizoaffektiv sjukdom, behandlad med stämningsstabiliserare och neuroleptika. Nu neutralt stämningsläge, inga vanföreställningar eller hallucinationer. Dock mycket låg funktionsnivå, måste ha hjälp med att betala räkningar, handla, städa och är mycket passiv. Förslag till CGI-S: 5 (Påtagligt sjuk). *Kommentar:* den mycket låga funktionsnivån gör att sjukdomsgraden är påtaglig, trots avsaknad av affektiva eller psykotiska symtom.

Officiell hemsida:

Saknas

Referenser:

Busner J, Targum SD. The clinical global impressions scale: applying a research tool in clinical practice. *Psychiatry (Edgmont (Pa : Township))* 2007; **4**(7): 28-37.

Guy W. ECDEU assesment manual for psychopharmacology publication; ADM, 76-338. Washington DC, US Department of health, education and welfare, 1976, s. 217-22.